



Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof butylhyoscine zijn **geneesmiddelen die krampen verminderen (spasmolytica)**.

Gebruik butylhyoscine bij **krampen** in het **spijsverteringsstelsel** (bijvoorbeeld bij het prikkelbaredarmsyndroom), bij krampen in de **urinewegen** of bij **genitale krampen (pijnlijke maandstonden)**.



Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](https://www.farmainfo.be).

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die butylhyoscine bevatten. Je ziet er hoeveel butylhyoscine ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.



Hoe gebruik ik dit geneesmiddel - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

Butylhyoscine mag worden gebruikt bij **volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, en in uitzonderlijke gevallen bij kinderen tussen 6 en 12 jaar**.

Je mag **niet meer innemen dan 100 mg (milligram) per dag (24 uur)**, te verdelen over meerdere innames gedurende de dag. Deze maximale dosis geldt voor een gemiddelde volwassene.

Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Neem butylhyoscine in op **gelijk welk moment** van de dag, **met of zonder voedsel**.

Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

Bespreek met je arts hoelang je butylhyoscine moet gebruiken.

De **behandeling moet zo kort mogelijk (maximaal 7 dagen)** zijn. Als de **klachten** van krampen **verminderd** zijn, **stop dan** met het gebruik van butylhyoscine.

Heb je ondanks het gebruik van butylhyoscine na 7 dagen nog evenveel of zelfs meer last van klachten? Neem dan **contact op met je arts**.



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee

te maken.

Stop de behandeling en neem contact op met je arts wanneer de volgende bijwerkingen optreden:

- bleekheid;
- onrustigheid;
- zwakke polsslag;
- klamme huid;
- verminderd bewustzijn;
- ademhalingsmoeilijkheden, kortademigheid, benauwd gevoel.

Stop de behandeling en neem contact op met je arts wanneer de volgende bijwerkingen optreden, want dit zijn symptomen van een **overgevoelighedsreactie**:

- jeuk, huiduitslag, netelroos (urticaria), roodheid van de huid;
- zwelling van de keel of tong, met ademhalingsmoeilijkheden, jeuk en huiduitslag.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van butylhyoscine zijn de volgende:

Soms (tot 1 op 100 mensen)

- snelle hartslag;
- droge mond;
- verstopping van de darmen (constipatie);
- minder zweten.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Goed idee dat je wil stoppen. **Ja**, je kan in één keer stoppen met het gebruik van butylhyoscine. Als je symptomen verdwenen of niet meer hinderlijk zijn, doe je dit **best zo snel mogelijk**.



Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem je volgende dosis butylhyoscine op het **volgende voorziene tijdstip**.

Neem **nooit een dubbele dosis** butylhyoscine om een vergeten dosis in te halen.

Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je **arts of apotheker of bel het Antigifcentrum (070 245 245)**.

Je kan volgende klachten krijgen:

- snelle hartslag;
- droge mond;
- verstopping van de darmen (constipatie);

- minder zweten.



Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen als je butylhyoscine gebruikt, behalve als je

- je duizelig voelt;
- een wazig of dubbel zicht hebt.

Enkel wanneer je deze klachten niet hebt, mag je een voertuig besturen of machines bedienen, maar blijf altijd voorzichtig.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alcohol drinken als je butylhyoscine gebruikt.

Er is geen bekend effect van alcohol op butylhyoscine.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten als je butylhyoscine gebruikt.

Er is geen bekend effect van voedsel op butylhyoscine.



Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Gebruik geen butylhyoscine als je zwanger bent of borstvoeding geeft zonder medisch advies.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Over het gebruik van butylhyoscine tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om zeker te zijn dat het veilig is. Weeg samen met je arts de ernst van je symptomen af tegen het risico voor je kind.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan het gebruik van butylhyoscine met je arts of je apotheker.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Over het gebruik van butylhyoscine tijdens de borstvoeding is onvoldoende bekend om zeker te zijn dat het veilig is. Weeg daarom samen met je arts de ernst van je klachten af tegen het risico voor het kind.

Als je borstvoeding geeft en butylhyoscine wil gebruiken, **bespreek dit dan met je arts of apotheker.**



Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Butylhyoscine kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen.

Er zijn voor butylhyoscine **geen mogelijk ernstige wisselwerkingen** bekend. De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Gebruik geen butylhyoscine in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- als je een **snelle hartslag** hebt;
- bij een **hoge druk in het oog** (glaucoom);
- als je **prostaatproblemen** hebt;
- als je je **blaas niet (volledig) kunt ledigen** bij het plassen;
- bij een **volledige verstopping van het spijsverteringsstelsel** (darmobstructie of -afsluiting);
- bij een **darmverlamming**;
- bij een aanzienlijke **verwijding van de dikke darm** (megacolon).

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van butylhyoscine, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 - 25°C).

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen **in je apotheek**. Klik [hier](#) voor meer informatie.

Hoelang bewaar ik dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na "EXP".

